



PRESS RELEASE

養命酒製造株式会社

2024 年 9 月 27 日

報道関係各位

季節の変わり目は、お通じが乱れがちではありませんか？
お通じの乱れは、便秘や痔の原因になります。
養命酒製造 漢方製剤シリーズ第 2 弾、
体力が比較的ある中等度以上で、
年齢とともに腸の動きが弱まり、便秘・痔がちの方のための漢方
「桃核承気湯（とうかくじょうきとう）」が新登場

養命酒製造株式会社（本店：東京都渋谷区 代表取締役社長 COO 田中英雄）は、自社通信販売の Yomeishu オンラインショップにて、漢方製剤の第 2 弾として、「養命酒製造 桃核承気湯エキス錠」を、2024 年 9 月 30 日から新発売いたします。本品は、昨年 9 月に上市した女性のための漢方薬「養命酒製造 当归芍薬散料エキス錠」に続く、養命酒製造 漢方製剤シリーズの商品です。



●便秘や痔の方に適した「桃核承気湯」

桃核承気湯は、5種の生薬の組み合わせで、腸を動かして、便の水分を増やして柔らかくし、油分で便の滑りをよくすることで、便秘に効くと考えられています。

体力が比較的ある中等度以上で、年齢とともに腸の動きが弱まり、便秘・痔がちの方に適する漢方処方です。

- 1) 漢方の伝統の医学書「傷寒論」に記載されています。
- 2) 5種の生薬（トウニン、ケイヒ、ダイオウ、カンゾウ、芒硝（硫酸ナトリウム））を配合。
- 3) 血（けつ）の巡りを改善します。



左から、トウニン、ケイヒ、ダイオウ、カンゾウ、芒硝（硫酸ナトリウム）

●「養命酒製造 桃核承気湯エキス錠」

生薬を長年研究してきた養命酒製造が選んだ漢方薬です。日本薬局方の基準に適合した5種の生薬を配合しております。

- ・服用に便利な錠剤タイプ。
- ・日々の生活において扱いやすい、アルミパウチ入り。
- ・悩みが穏やかに改善できるイメージが感じられる優しいデザイン。

●「まいにち養生 365」とは

養命酒製造が長年健康と向き合い、ハーブや生薬への知識を深める中で見出した健康観に基づき、「まいにち養生 365」シリーズの開発を行っております。

「養生ケア」、「養生グルメ」、「養生グッズ」の 3 つの商品カテゴリで独自の商品を提供しています。「養命酒製造 桃核承気湯エキス錠」は、「養生ケア」商品の第 4 弾となります。



登録第 6715660 号

「まいにち養生 365」、それは日々の不調や加齢に伴う変化に向き合いつつ、いたり、手当てしながら前を向く生き方です。「まいにち養生 365」をライフスタイルとしてご提案し、皆様の毎日が、より健やかで晴れやかなものとなるようなお手伝いできればと願っています。

養命酒製造株式会社として 100 年以上、お客様に寄り添う中で、健康に対する様々な不安やいつまでも健康でありたいとの願いを強く感じ、お客様のニーズがありながら、これまでの私達の商品では十分な解決がされていない健康不調に対して、漢方製剤の新製品を販売していく所存です。

今後も、養命酒製造株式会社は、生活者の信頼に応え、豊かな健康生活に貢献することを経営理念とし、お客様の健康に資する商品サービスを提供してまいります。

■ 本資料に関するお問い合わせ先

養命酒製造株式会社 通販グループ

担当：山下 誠也（やました せいや）

TEL：0265-83-0898

s-yamashita@yomeishu.co.jp

Yomeishu オンラインショップ：<https://www.yomeishu-online.jp/>

■ 参考情報

販売名	養命酒製造 桃核承気湯エキス錠														
リスク区分	第 2 類医薬品														
成分・分量	9 錠中 桃核承気湯エキス（ 3 / 4 量） 1.8 g を含有しています。														
	日局トウニン 3.75g 日局ケイヒ 3.0 g 日局ダイオウ 2.25 g 日局硫酸ナトリウム十水塩 1.5g 日局カンゾウ 1.125g 上記生薬量に相当します。														
効能・効果	添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸 Al、CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸 Mg、トウモロコシデンプンを含有しています。														
	＜成分に関連する注意＞ 本剤は生薬（薬用の草根木皮等）を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがありますが、効能・効果には変わりありません。														
用法・用量	体力中等度以上で、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症：月経不順、月経困難症、月経痛、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）、痔疾、打撲症														
	右記の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。	<table><tr><th>年 齢</th><th>1 回 量</th><th>1 日服用回数</th></tr><tr><td>成人(15才以上)</td><td>3錠</td><td rowspan="3">3回</td></tr><tr><td>7才以上15才未満</td><td>2錠</td></tr><tr><td>5才以上7才未満</td><td>1錠</td></tr><tr><td>5才未満</td><td colspan="2">服用しないこと</td></tr></table>		年 齢	1 回 量	1 日服用回数	成人(15才以上)	3錠	3回	7才以上15才未満	2錠	5才以上7才未満	1錠	5才未満	服用しないこと
年 齢	1 回 量	1 日服用回数													
成人(15才以上)	3錠	3回													
7才以上15才未満	2錠														
5才以上7才未満	1錠														
5才未満	服用しないこと														
使用上の注意	＜用法・用量に関連する注意＞														
	（ 1 ） 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。														
	（ 2 ） 食間とは食後 2 ～ 3 時間を指します。														
	してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）														
	1． 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください														
	他の瀉下薬（下剤）														
	2． 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください														
	相談すること														

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。(5) 高齢者。(6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(7) 次の症状のある人。むくみ(8) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、右記の
症状があらわれた場
合は副作用の可能性

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

4. 1ヵ月位(便秘に服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

6. 本剤の服用により、予期しない出血があらわれた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管・取扱い上の注意	（１）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックを しっかり閉めて保管してください。（２）小児の手の届かない所に 保管してください。（３）他の容器に入れ替えないでください。 （誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）（４） 吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかり閉めてください。 （５）本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につく と、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。（６） 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
内容量	135 錠
製造販売元	養命酒製造株式会社 長野県駒ヶ根市赤穂 16410
販売価格 （税込）	3,300 円

表示見本

切り口
切り口

あなたに寄り添う

養命酒製造の漢方

桃核承気湯

とうかくじょうきとう

便秘 痔

月経痛 産後の精神不安

体力中等度以上で、のぼせて便秘しがちな方に。

ときに月経不順、月経困難症、腰痛、高血圧の随伴症状
(頭痛 めまい 肩こり)、痔疾、打撲症などを訴える方に

錠剤

135錠

(成人用量1日3回として)

15日分

第2類医薬品

K02

販売名: 養命酒製造 桃核承気湯エキス錠

切り口
切り口

4 987236 610042

開封後はチェックを閉めて保管してください。

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。

販売名: 養命酒製造 桃核承気湯エキス錠 [第2類医薬品] 漢方製剤

△ 使用上の注意

× (してはいけないこと)

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。他の瀉下薬(下剤)

2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

△ (相談すること)

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。(5) 高齢者。(6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(7) 次の症状のある人。むくみ(8) 次の診察を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに右足の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢

4. 1ヵ月位(便秘に服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

6. 本剤の服用により、予期しない出血があらわれた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

養命酒製造株式会社 お客様相談室

☎03-3462-8222

受付時間: 9時～17時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931